


Spécialité : Prenoxad®

Prenoxad® contient de la **naloxone**, un **antidote aux opioïdes**. Il n'est **pas efficace** pour les surdoses occasionnées par **tout autre produit psychotrope non opioïde**.

Même si vous n'êtes **pas certain** que la **personne fait une overdose**, vous pouvez **utiliser Prenoxad®**, il n'a **pas d'effet nocif** sur sa santé. Pensez que son utilisation peut sauver la vie !





Comment administrer Prenoxad®

1

Avant d'administrer Prenoxad®

- Protégez
- Appelez **les secours 15 ou 112**
- Allongez la personne **sur le dos**
- Basculez prudemment la tête de la personne en arrière afin de **libérer les voies respiratoires**




2

Préparer Prenoxad®

- Retirez l'emballage plastique du kit en le **tirant le long de la ligne rouge**. Tenez la boîte par les deux bouts et **exercez une torsion pour l'ouvrir**.
- Ouvrez le bout du sachet d'une aiguille, **côté couleur bleue**, et reposez le sachet dans la boîte.
- Prenez la seringue et **dévissez le capuchon gris**.
- Saisissez de l'autre main le sachet de l'aiguille, **vissez l'aiguille sur la seringue** et sortez-la du sachet, **sans enlever le capuchon**. Votre seringue est prête à l'emploi.


N'appuyez pas sur le piston avant d'avoir piqué pour ne pas perdre le produit.



3

1ère injection de Prenoxad®

- Tenez fermement la seringue entre **le pouce et l'index** (en l'appuyant sur le majeur), **avec les graduations 1-2-3-4-5 visibles** (vers le haut).
- Repérez la zone à piquer : elle se situe sur le **côté extérieur de la cuisse, sur la moitié haute**.
- Décapuchonnez l'aiguille.
- Enfoncez plus de **la moitié de l'aiguille, perpendiculairement à la peau**. On peut **piquer à travers les vêtements**.
- Injectez **0,4 ml c'est à dire poussez le piston jusqu'au trait noir situé entre le 1 et le 2**.
- Retirez la seringue (avec l'aiguille) de la cuisse et posez la dans la boîte jaune, dans son emplacement initial. Pour que la seringue tienne bien, clipsez la dans les deux encoches.
- Notez **l'heure d'administration de Prenoxad®** sur la notice ou sur la peau de la victime (ou n'importe quel papier).



4

Après la 1ère injection de Prenoxad®

- Si la personne **respire**, **placez-la sur le côté** (position latérale de sécurité – PLS).
- Si la personne **ne respire pas**, démarrez un **massage cardiaque**.


Tant que la personne ne donne **pas de signes de réveil**, administrez de **nouvelles doses de Prenoxad®** toutes les **2 à 3 minutes**.



5

Injection des autres doses de Prenoxad®

- Si au bout de **2 à 3 minutes** il n'y a **pas d'amélioration** de l'état de conscience et de la fréquence respiratoire, **recommencez à injecter** (voir cadre « 1ère injection de Prenoxad® »).
- Recommencez à injecter toutes les 2 à 3 minutes tant qu'il n'y a pas d'amélioration. Si possible, **notez toutes les heures d'administration de naloxone**.
- Si l'aiguille se casse ou se tord, changez-là.



6

Quand les secours arrivent

- Donnez-leur **la boîte de Prenoxad®** et le matériel usagé
- Indiquez **l'heure de la dernière administration** de Prenoxad®
- Indiquez quel **produit a été consommé** si vous le savez.



Quand et comment changer l'aiguille ?

QUAND ?

- Si l'aiguille est **cassée**
- Si l'aiguille est **sale ou endommagée** (tombée par terre...)

COMMENT ?

- Commencez par **ouvrir le bout du sachet** de la 2ème aiguille et reposez-le.
- D'une main **tenez fermement la seringue**, de l'autre, **tenez la base de l'aiguille endommagée**, sur la partie bleue
- Dévissez l'aiguille en **tournant la seringue**
- Posez doucement l'aiguille endommagée dans la boîte jaune
- Vissez la **deuxième aiguille** sur la seringue
- **Information importante** : si jamais **vous vous piquez lors de cette opération**, informez-en les secours dès leur arrivée pour qu'ils mettent en place avec vous le **protocole de soin approprié**.



Que faire si on a dépassé la dose en appuyant sur le piston

- Gardez **la même surveillance**.
- Réinjectez quand même **une dose au bout de 2 à 3 minutes** selon le schéma préconisé, si l'état de conscience et de la respiration ne s'est pas amélioré.
- Si des signes de sevrage brutal apparaissent (réveil agité, envie de reconsommer...) : il faut essayer d'**éviter la reconsommation et rester avec la personne jusqu'à l'arrivée des secours**.